

Що варто знати про Кір

Написав Administrator

П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:24 - Останнє оновлення П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:30

Кір – гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів або очі від хворої на кір людини, яка поширює його при диханні, розмові, чханні й кашлі. В основному на кір хворіють нещеплені діти, що відвідують дитячі заклади, а також підлітки й дорослі, що раніше не хворіли на кір та не отримали щеплень проти нього.

Поза організмом людини збудник нестійкий і гине протягом 2 годин, тому заразитися через предмети, неможливо. Вірус також швидко гине під дією ультрафіолетового проміння (тому експерти прогнозують згасання спалаху влітку) та при дезінфекції.

Кір починається як звичайна застуда. Період інкубації (час від потрапляння збудника в організм до появи перших ознак захворювання) триває в середньому 9-11 днів. Джерелом інфекції є хвора людина з останніх двох днів інкубаційного періоду до п'ятого дня після появи висипання.

Зазвичай кір починається як гостра респіраторна вірусна інфекція. У хворого підвищується температури тіла до 38-39°С (однак у багатьох вона зростає незначно), з'являється нежить, грубий «гавкаючий» кашель, сиплість голосу, світлобоязнь, головний біль, загальна розбитість, порушення сну, одутлість обличчя, почервоніння кон'юнктив очей і слизової оболонки порожнини рота. Перший дзвіночок - “манна крупа” на щоках.

На другий-третій день хвороби на слизовій оболонці щік з'являються висипання у формі дрібних білих цяток, схожих на манну крупу. Цятки зберігаються протягом 1-3 днів, а потім зникають. На 4-ту добу хвороби за вухами і на переніссі, а протягом наступної – на шиї і верхньої частини грудей з'являються цятки рожевого або червоного кольору, які швидко зливаються у великі пурпурові плями. Згодом висипання поширюється на тулуб, руки і ноги. Внаслідок злиття висипань на обличчі, воно стає одутлим і зовнішній вигляд хворого різко змінюється.

Кір вкрай небезпечний своїми ускладненнями, такими як отит, пневмонія, енцефаліт. Першою ознакою ускладнення є повторне підвищення температури. У разі важкого перебігу захворювання на кір, супутні ускладнення небезпечні загрозою для життя хворого. Після перенесеного кору розвивається стійка довічна несприйнятливність до

Що варто знати про Кір

Написав Administrator

П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:24 - Останнє оновлення П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:30

захворювання. Та оскільки кір спричиняє зниження загального імунітету, як у період захворювання, так і протягом наступних кількох місяців, це може проявитися загостренням хронічних хвороб.

Актуальність теми:

Кожні 5-6 років кількість хворих на кір різко стрибає вгору. Всього у світі, за останніми підрахунками ВООЗ, щороку від ускладнень кору помирає 150 тисяч дітей.

В 2017 році українцям загрожує епідемія кору. Такий прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я та вітчизняних лікарів. Якщо проаналізувати ті роки, коли медики фіксували підйом захворюваності на кір (2001, 2005-2006, 2011-2012 роки), то можна помітити певну циклічність. Тож 2016-2017 роки є періодом, коли спеціалісти очікують підвищення рівня захворюваності на кір, якщо не будуть проводитися щеплення і створювати так званий "колективний" імунітет.

Рівень щеплень від найстрашніших інфекційних хвороб в Україні найнижчий у світі – 50% населення. Востаннє епідемія кору була в Україні у 2012 році. Тоді вірус підхопило 12 тисяч людей. Нову хвилю очікують саме в 2017 році. У категорію ризику захворювання на кір у 2017 році потраплять люди старші 30 років.

Причинами епідемії є:

- Масові відмови від щеплень
- Фальсифікації записів про вакцинацію
- Низька якість вакцин

У коледжі працює гурток мікробіології та інфекційних хвороб, учасники якого досліджували проблеми захворюваності на кір у Новоселицькому районі та оформили дослідницьку роботу

Що варто знати про Кір

Написав Administrator

П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:24 - Останнє оновлення П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:30

Враховуючи зростання захворюваності на кір по Чернівецькій області у 2010-2011 році, а також випадки хвороби у Новоселицькому районі ми вважали доцільним дослідити цю проблему. Розпочата дослідницька робота у 2012 році. Метою її було вивчення розповсюдження кору та ефективність проведення щеплень у Новоселицькому районі Чернівецької області.

Проводився аналіз даних СЕС, КІЗ та статистичних даних інфекційного відділення і дитячої поліклініки Новоселицької ЦРЛ.

Результати роботи

За даними Новоселицької районної санепідстанції у 2012 році у Новоселицькому районі було 38 випадків кору, із них 26 хворих проходили лікування у інфекційному відділенні ЦРЛ. Ми провели аналіз кожного із цих випадків і зробили висновки.

Нами встановлено, що найбільша кількість їх була у селі Стальнівці – 14 випадків (що склало 53,8% від загальної кількості) і переважна більшість їх була у січні 2012 року. Декілька випадків кору було у селі Ванчиківці – 3 випадки (11,5%), із них один випадок – студент нашого коледжу. Поодинокі пацієнти були із інших населених пунктів Тарасівці, Балківці, Слобода, Котелево, Динівці, Мамалига.

Захворюваність по місяцях року складала: у січні – 12 випадків, у лютому – 5, у березні – 6, наступні три місяці – по одному випадку хвороби.

За віковими категоріями найбільша частка припадала все-таки на дітей і підлітків (73%) і тільки близько 27% - дорослого населення. Всі випадки дитячих захворювань ми поділили на діти (до 15 років) і підлітки (15-18 років). Дітей до 15 років було 11 випадків – це 57,9%, а підлітків (до 18 років) – 8 випадків (42,1%). Усі захворювання були підтверджені серологічними методами (ІФА – імуноферментний аналіз)

Незважаючи на тенденцію до «подорослішання» кору, при спалахах захворюваність у 3,3 рази вища серед дітей, ніж серед дорослих.

Що варто знати про Кір

Написав Administrator

П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:24 - Останнє оновлення П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:30

Вивчаючи розповсюдженість випадків кору в Новоселицькому районі ми спостерігали відсутність захворюваності протягом 2013-2016 років. Протягом цих років була визначена ефективність проведених щеплень.

Висновки Результати дають підставу стверджувати про необхідність удосконалення та покращення профілактичної роботи серед населення нашого району, а саме імунопрофілактики; створення санітарно-просвітницьких брошурок з подальшим використанням їх у агітаційній роботі студентів та публікація даних досліджень у районній газеті та медичних виданнях.

Що варто знати про Кір

Написав Administrator

П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:24 - Останнє оновлення П'ятниця, 10 лютого 2017, 11:30

